

心不全患者さんを 診られている先生方へ

【心不全治療】 サムスカ 導入入院のしおり



医療法人社団 慈誠会

上板橋病院

院長 小出 純
ご連絡先: 03-3933-7191

◆心不全における利尿薬

心不全の浮腫(うっ血所見)治療には、利尿薬が用いられます。既存の利尿薬は電解質排泄を伴いますが、腎集合管に働き、水のみを排泄させる、水利尿薬(サムスカ)の使用経験が増えております。サムスカは、高い利尿効果、血行動態に影響が少なく、腎機能悪化抑制、再入院の抑制等の特徴があります。但し、入院下で処方開始できる薬剤であり、少し高価な薬剤になります。(サムスカ7.5mg: 3割負担 383.19円/日、1割負担 127.73円/日)

◆下記4項目の内、いずれかに該当する場合はご紹介ください。

心不全の基本治療(塩分制限・利尿剤投与・RAS系阻害剤投与・β遮断薬投与等)を行っているにも関わらず、体液量のコントロールが困難な患者さん

心不全の基本治療中で、下記利尿薬用量より多く投与されている患者さん
『 ラシックス20mg・ダイアート30mg・ルプラック4mg 』

心不全の基本治療中で、徐々に腎機能の低下が見られる患者さん
『 血清クレアチニン値(sCr) > 1.3mg/dL 』

心不全の基本治療中で、血清ナトリウム値が135mEq/L未満の患者さん

◆概ね1~2週間程度の入院を予定しております。
お仕事のご都合等により、入院期間についてもご相談して決めていきたいと思っております。

入院日数	検査等	サムスカ服薬
1日目	・血圧、採血、採尿 ・胸部レントゲン ・心電図 ・投与薬剤チェック	—
2日目	・血圧、採血、採尿 ・生活・栄養指導	○ 服薬開始
3日目		○
4日目	採血等 必要に応じた検査	○
5日目		○
6日目		○
退院日	・血圧、採血、採尿 ・退院後の生活指導	サムスカ継続服薬